

# Sistemas lineales

## Question 1

[Top 1](#) [Bottom](#) [Focus](#) [Help](#)

Calcular el vector  $\mathbf{x}^{(k)}$  de la iteración k-ésima cuando  $k=4$  si se utiliza el método SOR en la resolución del sistema:

$$\begin{bmatrix} 6 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -8 & -4 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & 5 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 7 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 73 \\ -53 \\ 43 \\ 66 \\ 30 \end{bmatrix}, \quad \text{tomando } \mathbf{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

que tiene como solución el vector  $\mathbf{x} = [9, 1, 5, 9, 7]^T$ . Calcular en cada iteración k el valor de la estimación del error absoluto  $\|\mathbf{e}^{(k)}\| = \|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\|_\infty$  y también del error relativo  $\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\|_\infty / \|\mathbf{x}^{(k)}\|_\infty$ . Usar  $\omega = .66$  como parámetro de relajación. Dar los resultados con cuatro decimales exactos.

You have not attempted this yet

The teacher's answer was:

$$\begin{bmatrix} 9.3 & 1.40 & 4.99 & 8.74 & 7.6 & 0.500 \end{bmatrix}$$

### Solution:

A continuación aparece el ejercicio resuelto por los diferentes métodos, unas 20 iteraciones con cada método. Las diferencias en la velocidad de convergencia pueden ser importantes.

En el caso de Jacobi, la componente i-ésima de la iteración (k+1)-ésima se obtiene utilizando la fórmula:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left( b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right)$$

para cada componente  $i = 1, 2, \dots, n$  de cada iteración  $\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)}, \dots$ , cuando  $k = 0, 1, 2, \dots$ .

JACOBI							
Iter.	$\mathbf{x}^{(k)}$					Estimación errores	
<b>k</b>	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$x_4^{(k)}$	$x_5^{(k)}$	$\ \mathbf{e}^{(k)}\ _\infty$	$\ \mathbf{e}^{(k)}\ _\infty / \ \mathbf{x}^{(k)}\ _\infty$
0	1	1	1	1	1	0	0
1	11.66666667	5.750000000	7.800000000	9.285714286	6.200000000	10.66666667	.9142857143
2	8.800000000	-.3714285712	3.202857142	7.826190476	7.923333334	6.121428571	.6956168831
3	8.991746032	2.076607144	5.598666666	9.356394557	7.045142858	2.448035715	.2616430613
4	8.885174602	.6059251712	4.489049660	8.853827097	7.093937302	1.470681973	.1655208861
5	9.053845957	1.280276234	5.168077052	9.086119647	7.000410022	.679027392	.7473238504e-1
6	8.971850485	.8943803100	4.870583572	8.952326833	7.033209028	.3858959240	.4301185409e-1
7	9.010499728	1.072475376	5.045140704	9.023854033	6.999129444	.1780950660	.1973603134e-1
8	8.992766735	.9715749588	4.966413156	8.988022049	7.007566880	.1009004172	.1122017508e-1
9	9.003075513	1.018842050	5.012252230	9.006175027	6.999585708	.472670912e-1	.5248298091e-2
10	8.998096058	.9923819150	4.991311032	8.996809736	7.001933066	.264601350e-1	.2940637089e-2
11	9.000803807	1.004900416	5.003298672	9.001636441	6.999833388	.125185010e-1	.1390691691e-2
12	8.999505758	.9979623800	4.997745868	8.999161310	7.000481110	.69380360e-2	.7709352254e-3
13	9.000215318	1.001276600	5.000886564	9.000430424	6.999944454	.33142200e-2	.3682290562e-3
14	8.999870755	.9994560550	4.999414386	8.999778933	7.000121072	.18205450e-2	.2022856827e-3
15	9.000057245	1.000332940	5.000237578	9.000113466	6.999982484	.8768850e-3	.9743043833e-4
16	8.999966242	.9998550350	4.999847634	8.999941757	7.000030520	.4779050e-3	.5310075473e-4

17	9.000015222	1.000086929	5.000063530	9.000029891	6.999994728	.2318940e-3	.2576591443e-4
18	8.999991168	.9999614212	4.999960304	8.999984654	7.000007724	.1255078e-3	.1394532480e-4
19	9.000004042	1.000022719	5.000016956	9.000007877	6.999998456	.612978e-4	.6810860706e-5
20	8.999997688	.9999897462	4.999989644	8.999995957	7.000001960	.329728e-4	.3663645386e-5

Para Gauss-Seidel, la componente  $i$ -ésima de la iteración  $(k+1)$ -ésima se calcula como:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left( b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right)$$

para cada componente  $i = 1, 2, \dots, n$  de cada iteración  $\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)}, \dots$ , cuando  $k = 0, 1, 2, \dots$ . Se utilizan las últimas componentes calculadas en la obtención de las siguientes.

GAUSS-SEIDEL							
Iter.	$\mathbf{x}^{(k)}$					Estimación errores	
<b>k</b>	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$x_4^{(k)}$	$x_5^{(k)}$	$\  \mathbf{e}^{(k)} \ _\infty$	$\  \mathbf{e}^{(k)} \ _\infty / \  \mathbf{x}^{(k)} \ _\infty$
0	1	1	1	1	1	0	0
1	11.66666667	5.750000000	5.900000000	7.083333333	8.303333334	10.66666667	.9142857143
2	8.415555555	.8662500000	5.176166666	9.288789683	6.821127778	4.883750000	.5257681750
3	9.030262962	.8620782738	5.033185198	8.989826649	6.971831208	.614707407	.6807192765e-1
4	9.003858730	.9894718375	5.011879694	8.996928663	6.996290174	.1273935637	.1414877416e-1
5	8.999256660	.9952917150	5.003239548	9.000248829	6.998261766	.8640146e-2	.9599896807e-3
6	9.000039487	.9985352975	5.000883762	8.999955283	6.999538204	.32435825e-2	.3603964743e-3
7	9.000006638	.9996270225	5.000250494	8.999986363	6.999876634	.10917250e-2	.1213026883e-3
8	8.999999373	.9998935825	5.000069968	8.999997669	6.999964598	.2665600e-3	.2961777984e-4
9	9.000000138	.9999700238	5.000019536	8.999999206	6.999990126	.764413e-4	.8493477648e-5
10	9.000000035	.9999916650	5.000005466	8.999999776	6.999997246	.216412e-4	.2404577768e-5
11	9.000000007	.9999976675	5.000001528	8.999999939	6.999999230	.60025e-5	.6669444439e-6
12	9.000000002	.999993475	5.000000428	8.999999983	6.999999784	.16800e-5	.1866666666e-6
13	9.000000000	.999998175	5.000000120	8.999999996	6.999999940	.4700e-6	.5222222222e-7
14	9.000000000	.999999488	5.000000034	8.999999999	6.999999984	.1313e-6	.1458888889e-7
15	9.000000000	.999999850	5.000000010	9.000000000	6.999999996	.362e-7	.4022222222e-8
16	9.000000000	.999999950	5.000000002	9.000000000	6.999999998	.100e-7	.1111111111e-8
17	9.000000000	.999999988	5.000000000	9.000000000	7.000000000	.38e-8	.4222222222e-9
18	9.000000000	1.000000000	5.000000000	9.000000000	7.000000000	.12e-8	.1333333333e-9
19	9.000000000	1.000000000	5.000000000	9.000000000	7.000000000	0.	0.
20	9.000000000	1.000000000	5.000000000	9.000000000	7.000000000	0.	0.

El método SOR (Successive Overrelaxation) pretende ser una aceleración del método de Gauss-Seidel. Introduce un parámetro  $\omega$  de aceleración o relajación para realizar una media ponderada de la iteración anterior y la actual con Gauss-Seidel. Si  $\omega = 1$  es el método de Gauss-Seidel. En SOR, la componente  $i$ -ésima de la iteración  $(k+1)$ -ésima es por tanto:

$$x_i^{(k+1)} = \omega z_i^{(k+1)} + (1 - \omega) x_i^{(k)}$$

para cada componente  $i = 1, 2, \dots, n$  de cada iteración  $\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)}, \dots$ , cuando  $k = 0, 1, 2, \dots$ . El valor  $z_i^{(k+1)}$  es la  $i$ -ésima componente del vector de la  $(k+1)$ -ésima iteración calculada por Gauss-Seidel a partir del vector actual  $\mathbf{x}^{(k+1)}$ .

SOR, $\omega = .66$							
Iter.	$\mathbf{x}^{(k)}$					Estimación errores	
<b>k</b>	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$x_4^{(k)}$	$x_5^{(k)}$	$\  \mathbf{e}^{(k)} \ _\infty$	$\  \mathbf{e}^{(k)} \ _\infty / \  \mathbf{x}^{(k)} \ _\infty$
0	1	1	1	1	1	0	0
1	8.040000000	4.135000000	4.660360000	5.509214286	5.291932480	7.040000000	.8756218905
2	9.086735255	2.894876414	5.070523654	7.465248818	6.671520661	1.956034532	.2152626303
3	9.093997840	1.901318665	5.031976344	8.353369562	7.015477927	.993557749	.1092542319

4	9.025036724	1.401313246	4.988237391	8.741406287	7.063093355	.500005419	.5540203705e-1
5	8.995925834	1.177790926	4.974869955	8.901647932	7.047699519	.223522320	.2484706123e-1
6	8.990885194	1.081034711	4.976748759	8.964276661	7.028780426	.96756215e-1	.1076158942e-1
7	8.993126909	1.038744677	4.982782446	8.987562612	7.016265111	.42290034e-1	.4702483844e-2
8	8.995978756	1.019565281	4.988475540	8.995839275	7.009103180	.19179396e-1	.2131996586e-2
9	8.997897769	1.010390775	4.992686116	8.998662163	7.005154601	.9174506e-2	.1019541109e-2
10	8.998955756	1.005741934	4.995493595	8.999588215	7.002967506	.4648841e-2	.5165615236e-3
11	8.999487810	1.003262496	4.997269166	8.999880472	7.001732462	.2479438e-2	.2754967700e-3
12	8.999745105	1.001887219	4.998360384	8.999968801	7.001020933	.1375277e-2	.1528090853e-3
13	8.999869089	1.001103649	4.999020523	8.999993936	7.000604811	.783570e-3	.8706339199e-4
14	8.999930175	1.000649572	4.999416456	9.000000301	7.000359190	.454077e-3	.5045299831e-4
15	8.999961428	1.000383742	4.999652835	9.000001423	7.000213513	.265830e-3	.2953666200e-4
16	8.999978101	1.000227187	4.999793616	9.000001260	7.000126934	.156555e-3	.1739499756e-4
17	8.999987331	1.000134671	4.999877355	9.000000892	7.000075450	.92516e-4	.1027955454e-4
18	8.999992585	1.000079890	4.999927133	9.000000583	7.000044839	.54781e-4	.6086777383e-5
19	8.999995631	1.000047413	4.999956713	9.000000368	7.000026641	.32477e-4	.3608555408e-5
20	8.999997417	1.000028146	4.999974286	9.000000226	7.000015826	.19267e-4	.2140777724e-5

SOR, $\omega = .9$							
Iter.	$\mathbf{x}^{(k)}$					Estimación errores	
$\mathbf{k}$	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$x_4^{(k)}$	$x_5^{(k)}$	$\ \mathbf{e}^{(k)}\ _\infty$	$\ \mathbf{e}^{(k)}\ _\infty / \ \mathbf{x}^{(k)}\ _\infty$
0	1	1	1	1	1	0	0
1	10.60000000	5.27500000	5.58100000	6.673214286	7.35292000	9.60000000	.9056603774
2	8.966974000	1.649873286	5.179441446	8.733387920	7.114025052	3.625126714	.4042753680
3	8.935573667	1.031398578	5.034106321	8.992245582	6.999318371	.618474708	.6877867184e-1
4	8.988645909	.9896134417	5.008668282	9.001932147	6.994458229	.53072242e-1	.5895650082e-2
5	8.999226879	.9952493336	5.003226800	9.000190904	6.997870717	.10580970e-1	.1175638396e-2
6	9.000077453	.9982694638	5.001294580	8.999957864	6.999256494	.30201302e-2	.3355671344e-3
7	9.000036610	.9993375106	5.000509372	8.999980662	6.999721305	.10680468e-2	.1186713839e-3
8	9.000010864	.9997402376	5.000198097	8.999994235	6.999891670	.4027270e-3	.4474739043e-4
9	9.000003869	.9998983642	5.000076936	8.999998066	6.999957721	.1581266e-3	.1756961467e-4
10	9.000001530	.9999604075	5.000029906	8.999999264	6.999983538	.620433e-4	.6893698828e-5
11	9.000000605	.9999846006	5.000011631	8.999999712	6.999993598	.241931e-4	.2688122042e-5
12	9.000000236	.9999940119	5.000004521	8.999999888	6.999997512	.94113e-5	.1045699973e-5
13	9.000000092	.9999976721	5.000001758	8.999999958	6.999999033	.36602e-5	.4066888847e-6
14	9.000000034	.9999990944	5.000000684	8.999999983	6.999999623	.14223e-5	.1580333327e-6
15	9.000000013	.9999996473	5.000000266	8.999999992	6.999999852	.5529e-6	.6143333324e-7
16	9.000000006	.9999998646	5.000000105	8.999999996	6.999999943	.2173e-6	.2414444443e-7
17	9.000000001	.9999999471	5.000000040	9.000000000	6.999999978	.825e-7	.9166666666e-8
18	9.000000000	.9999999789	5.000000014	9.000000000	6.999999990	.318e-7	.3533333333e-8
19	9.000000002	.9999999923	5.000000007	9.000000000	6.999999997	.134e-7	.1488888889e-8
20	9.000000000	.9999999958	5.000000003	9.000000000	6.999999998	.4e-8	.4444444444e-9

SOR, $\omega = 1.1$							
Iter.	$\mathbf{x}^{(k)}$					Estimación errores	
$\mathbf{k}$	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$x_4^{(k)}$	$x_5^{(k)}$	$\ \mathbf{e}^{(k)}\ _\infty$	$\ \mathbf{e}^{(k)}\ _\infty / \ \mathbf{x}^{(k)}\ _\infty$
0	1	1	1	1	1	0	0

1	12.73333333	6.225000000	6.181000000	7.449404763	9.311013332	11.73333333	.9214659686
2	7.562778445	-.634006432e-1	5.182504302	9.911173674	6.178610837	6.288400643	.6344758804
3	9.411439056	.8683309468	5.019931360	8.735843336	7.139303416	1.848660611	.1964269864
4	8.904124092	1.055693520	5.000969428	9.054620577	6.977016258	.507314964	.5602829624e-1
5	9.017837234	.9820370690	5.000846641	8.990945965	7.002084460	.113713142	.1260980200e-1
6	8.997296757	1.003533887	4.999893732	9.001102432	6.999997674	.214968180e-1	.2388242792e-2
7	9.000290659	.9994022103	5.000031633	8.999937654	6.999925705	.41316767e-2	.4590603633e-3
8	8.999992377	1.000069742	4.999996213	8.999984798	7.000021930	.6675317e-3	.7417025171e-4
9	8.999993415	.9999962738	5.000000537	9.000006586	6.999995419	.734682e-4	.8163127360e-5
10	9.000002238	.9999988956	4.999999990	8.999998444	7.000000708	.8823e-5	.9803330896e-6
11	8.999999518	1.000000446	4.999999989	9.000000272	6.999999925	.2720e-5	.3022222131e-6
12	9.000000078	.9999998974	5.000000001	8.999999964	7.000000002	.560e-6	.6222222168e-7
13	8.999999992	1.000000020	5.000000000	9.000000003	7.000000002	.1226e-6	.1362222222e-7
14	9.000000001	.9999999970	5.000000000	9.000000000	7.000000000	.230e-7	.2555555555e-8
15	9.000000000	1.000000000	5.000000000	9.000000000	7.000000000	.30e-8	.3333333333e-9
16	9.000000000	1.000000000	5.000000000	9.000000000	7.000000000	0.	0.
17	9.000000000	1.000000000	5.000000000	9.000000000	7.000000000	0.	0.
18	9.000000000	1.000000000	5.000000000	9.000000000	7.000000000	0.	0.
19	9.000000000	1.000000000	5.000000000	9.000000000	7.000000000	0.	0.
20	9.000000000	1.000000000	5.000000000	9.000000000	7.000000000	0.	0.



(cc) Jesús García Quesada 2010

**Mark summary:**

Question	Value	Your mark
<a href="#">1</a>	2.00	-
Total	2.00	0.00

[New Version](#) Click here to see a new version of this quiz.

[New Quiz](#) Click here to select a new quiz.

If you have technical problems, you can send email to the [administrator](#).  
Mathematical questions can be sent to the [teacher](#).